



Ελληνικό Κέντρο  
Εκπαίδευσης  
Επαγγελματιών Υγείας

Σε συνεργασία με:  
Διαβητολογικό Κέντρο  
του ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»



Υπό την Αιγίδα:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
HELLENIC DIABETES ASSOCIATION



# Επιστημονική Συνάντηση

Αποφοίτων - Συνεργατών - Εκπαιδευτών  
Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

**«Ενημέρωση για το Σακχαρώδη Διαβήτη -  
Μεταβολικά Νοσήματα - Νέα τεχνολογικά επιτεύγματα,  
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 2022»**

**18-20 Φεβρουαρίου 2022**

Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ» - Ναύπλιο

**Τελικό Πρόγραμμα**

Χορηγούνται 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Congress World Mov. IKE

📍 Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

☎ 210 7210001, 210 7222518, 📠 210 7210051, 🌐 [www.congressworld.gr](http://www.congressworld.gr)

✉ [info@congressworld.gr](mailto:info@congressworld.gr), [reception@congressworld.gr](mailto:reception@congressworld.gr)



# ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Στην προσπάθεια όπως συνεχιστεί η παράδοση των τακτικών συναντήσεων των αποφοίτων του ΓΝ Πειραιά «TZANEIO» και κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διοργανώνουμε την καθιερωμένη επιστημονική συνάντηση των αποφοίτων, συνεργατών, εκπαιδευτών του Διαβητολογικού Κέντρου του ΓΝ Πειραιά «TZANEIO».

Ο καθένας από σας έχετε βάλει ένα λιθαράκι σ' αυτό το οικοδόμημα γνώσης, εκπαίδευσης και κλινικής δράσης.

Εκτός από την ιατρική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων θα μας δοθεί η δυνατότητα να ξαναβρεθούμε μαζί.

Στην τωρινή μας συνάντηση - 5 χρόνια μετά την τελευταία παρόμοια, θα συζητηθεί ό,τι νεότερο αφορά τα καρδιομεταβολικά νοσήματα καθώς και τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα. Θα έχουμε έτσι την ευκαιρία εποικοδομητικής ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων μεταξύ μας.

Καλή μας συνάντηση.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

## **Δρ. Αλέξανδρος Καμαράτος**

Παθολόγος - Διαβητολόγος, MD, PhD, Διευθυντής ΕΣΥ,  
Επιστημονικός Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝ  
Πειραιά «TZANEIO», Συντονιστής Εκπαίδευσης Γενικών  
Ιατρών ΓΝ Πειραιά «TZANEIO»

## **Δρ. Ανδρέας Μελιδώνης**

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής,  
Διαβητολογικό Καρδιομεταβολικό Κέντρο  
«METROPOLITAN HOSPITAL»

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

**15:00-16:00** **Εγγραφές - Χαιρετισμοί**

**16:00-17:30** **Μη Φαρμακευτική αντιμετώπιση του ΣΔ**

*Προεδρείο:* **Α. Καμαράτος, Κ. Φακατσέλη**

Το Διαιτολόγιο του Διαβητικού ατόμου τύπου 2 (Γενικές αρχές - Σύσταση - Τύποι Δίαιτας - Ιδιαιτερότητες)

**Α. Τσαγκάρη**

Το Διαιτολόγιο του Διαβητικού ατόμου τύπου 1 (Γενικές αρχές - Σύσταση - Τύποι Δίαιτας - Ιδιαιτερότητες)

**Κ. Φακατσέλη**

Άσκηση και ΣΔ

**Α. Γανωτοπούλου**

**17:30-18:30** **Covid-19 και Σακχαρώδης Διαβήτης. Νεότερα δεδομένα**

Οδηγίες για νοσηλεία μη σοβαρής νόσωσης Covid σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη

*Προεδρείο:* **Α. Σερέτη, Ι. Κυριαζής**

*Ομιλήτρια:* **Ε. Χουρδάκη**

Σχολιασμός/παρουσίαση περιστατικών/συζήτηση με το κοινό:

**Κ. Χαρηίδης, Α. Κουτσοβασίλης**

**18:30-19:30** **Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες στην αντιμετώπιση της διαβητικής δισλιπιδαιμίας**

*Προεδρείο:* **Α. Μελιδώνης, Σ. Ηρακλειανού**

*Ομιλητής:* **Α. Κουτσοβασίλης**

Σχολιασμός/παρουσίαση περιστατικών/συζήτηση με το κοινό:

**Α. Φούτρης**

**19:30-20:30** **Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί  
Διάλεξη Έναρξης**

*Προεδρείο:* **Α. Καμαράτος, Α. Μελιδώνης**

TBA

**Κ. Mantzoros**

**20:30-21:30** **Δορυφορικό Κλινικό Φροντιστήριο**

Σελ. 4

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022

**09:00-10:00 ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ**

Προεδρείο/Σχολιασμός: **Α. Καμαράτος, Σ. Ηρακλειανού**  
Ομιλητές: **Ε. Γιάννου, Χ. Κώνστας**

**10:00-10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ**

Βυνη out των επιστημόνων υγείας στην εποχή της πανδημίας  
Προεδρείο: **Α. Τρικκαλινού**  
Ομιλήτρια: **Μ. Μελετιάδου**

**10:30-12:30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**

**Θεραπείες Διαβήτη τύπου 2**  
Προεδρείο: **Α. Μελιδώνης, Θ. Παναγιώτου**  
Ομιλητές: **Α. Τρικκαλινού, Β. Κατσούρη**

Σχολιασμός/παρουσίαση περιστατικών/συζήτηση με το κοινό:  
**Σ. Φλώρου, Ο. Βράνου, Ε. Δήμου**

**12:30-13:00 Διαβήτης Κύησης**

Προεδρείο: **Σ. Ηρακλειανού**  
Ομιλήτρια: **Β. Λιόση**

Σχολιασμός/παρουσίαση περιστατικών/συζήτηση με το κοινό:  
**Α. Μπάρα, Α.-Μ. Τσαντάνη**

**13:00-14:00 ΥΠΕΡΤΑΣΗ 2022 ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ**

Προεδρείο: **Σ. Αντωνόπουλος, Θ. Παναγιώτου**  
Ομιλητές: **Χ. Μέλλος, Π. Κωνσταντινόπουλος**

Σχολιασμός/παρουσίαση περιστατικών/συζήτηση με το κοινό:  
**Ε. Φουστέρης, Α. Χαραμής, Γ. Τσουρούς, Ι. Σταύρου**

**14:00-15:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ»**

Προεδρείο: **Σ. Αντωνόπουλος, Α. Κουτσοβασίλης**  
Ομιλητές: **Β. Γκιζλής, Ο. Βράνου, Α. Γανωτοπούλου**

Σχολιασμός/παρουσίαση περιστατικών/συζήτηση με το κοινό:  
**Α. Νικολάου, Κ. Λευκαδίτης, Χ. Μέλλος**

**15:00-17:00 Μεσημβρινή Διακοπή**

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022

**17:00-18:00 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ**

Προεδρείο: **Α. Μελιδώνης, Σ. Ηρακλειανού**

Δείκτες παχυσαρκίας - Επιπλοκές

**Γ. Αργυρακοπούλου**

Θεραπευτικές επιλογές παχύσαρκου διαβητικού ασθενή

**Ι. Κυριαζής**

Σχολιασμός/παρουσίαση περιστατικών/συζήτηση με το κοινό:

**Κ. Πετροπούλου**

**18:00-19:00 Νεότερες τεχνολογίες στο Διαβήτη: Βιονικό πάγκρεας-CGM-FLASH-GLUCOSE**

Προεδρείο: **Α. Καμαράτος, Α. Κουτσοβασίλης**

Ομιλητές: **Ε. Φουστέρης, Α. Κουτσοβασίλης, Ε. Χουρδάκη**

Σχολιασμός/παρουσίαση περιστατικών/συζήτηση με το κοινό:

**Μ. Αναγνωστοπούλου, Ν. Γιαννακόπουλος, Β. Βελισσάρης**

**19:00-19:30 STATE OF THE ART LECTURE**

Προεδρείο/Σχολιασμός: **Α. Μελιδώνης, Α. Καμαράτος**

In the era of omics: Νεότερα δεδομένα κι εφαρμογή στα μεταβολικά νοσήματα

Ομιλήτρια: **Α. Αγγελίδη**

**19:30-20:30 Δορυφορικό Κλινικό Φροντιστήριο**

Σελ. 6

**20:30-21:00 ΔΙΑΛΕΞΗ ΗΜΕΡΑΣ**

Προεδρείο: **Α. Καμαράτος, Σ. Ηρακλειανού**

Οι νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες ADA - EASD για το Σακχαρώδη Διαβήτη 2022

**Α. Μελιδώνης**

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022

## 09:00-10:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Νεφροπάθεια: Πρώιμη διάγνωση - παρακολούθηση. Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Προεδρείο: **Α. Καμαράτος, Ε. Χελιώτη**

Διαβητική Νεφροπάθεια: Πρώιμη διάγνωση - παρακολούθηση

**Μ. Μυλωνοπούλου**

Διαβητική Νεφροπάθεια: Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις

**Ε. Χελιώτη**

Σχολιασμός / παρουσίαση περιστατικών / συζήτηση

**Κ.Β. Ρούσου**

## 10:00-10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Α. Καμαράτος**

Σύγχρονες στατιστικές τεχνικές: Σχεδιασμός, εκτέλεση και ερμηνεία μετα-αναλύσεων

**Ε. Ξουργιά**

## 10:30-11:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Α. Καμαράτος**

Διερεύνηση αναιμίας: Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ΠΦΥ

**Κ. Χαρηίδης**

## 11:00-12:30 Προδιαβητική κατάσταση και καρδιαγγειακός κίνδυνος: Υπάρχει σχέση;

Προεδρείο: **Σ. Ηρακλειανού, Θ. Παναγιώτου**

Ομιλητής: **Ε. Φουστέρης**

Παρουσίαση περιστατικών/συζήτηση με το κοινό:

**Ε. Λιούρη, Α. Ντίνας, Β. Κατσικερού**

## 12:30-13:00 Κλείσιμο - Συμπεράσματα

## ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

**20:30-21:30 Διαδραστικό Κλινικό Φροντιστήριο**

(για περιορισμένο αριθμό ατόμων)

Καταγραφή της γλυκόζης με τεχνολογία Flash: Κλινικό φροντιστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για την επιτυχεστέρα διαχείριση των ατόμων με διαβήτη  
Συντονιστής/Εισηγητής: **Ε. Φουστέρης**

 **Abbott** Σελ. 4

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022

**19:30-20:30 Διαδραστικό Κλινικό Φροντιστήριο**

(για περιορισμένο αριθμό ατόμων)

Καταγραφή της γλυκόζης με τεχνολογία Flash: Κλινικό φροντιστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για την επιτυχεστέρα διαχείριση των ατόμων με διαβήτη  
Συντονιστής/Εισηγητής: **Ε. Φουστέρης**

 **Abbott** Σελ. 6



# Vipidia®

## αλογλιπτίνη

**1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ** Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 25mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ**  
Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 6,25 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 12,5 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 25 mg αλογλιπτίνης.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκτετήριο.

**Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
VIPIDIA F.C.TAB 6,25mg/TAB ΒΤx28 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	15,47 €
VIPIDIA F.C.TAB 12,5mg/TAB ΒΤx28 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	19,16 €
VIPIDIA F.C.TAB 25mg/TAB ΒΤx28 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	36,56 €
VIPDOMET F.C.TAB (12,5+850)mg/TAB ΒΤx56 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	36,56 €
VIPDOMET F.C.TAB (12,5+1000)mg/TAB ΒΤx56 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	36,59 €
INCRESYNC F.C.TAB (25+30)mg/TAB ΒΤx28 (NYL/alu/PVC blister)	37,98 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Δικαιούχος Σήματος και  
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:



Takeda Hellas S.A.  
Green Plaza, Building B'  
59-61 Ag. Konstantinou Str.  
Marousi, 15124, Athens - Greece  
Tel.: +30 210 6387810  
Fax: +30 210 6387801  
[www.takeda.com](http://www.takeda.com)

Προώθηση:



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,  
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300  
[www.elpen.gr](http://www.elpen.gr)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

# GlucoMen<sup>®</sup> Day CGM

REAL TIME ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

## Η αξία του κάθε λεπτού!

Νέα Συνεχής Καταγραφή Γλυκόζης  
σε πραγματικό χρόνο με μία  
νέα τιμή κάθε λεπτό (rtCGM)

**1.440**  
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  
ΓΛΥΚΟΖΗΣ  
ανά 24ωρο



Συναγερμοί  
και Ειδοποιήσεις



Κοινοποίηση  
δεδομένων  
μέσω cloud



1 νέο δεδομένο  
ανά λεπτό



fitbit



Φιλικό προς  
το περιβάλλον



14 ημέρες  
διάρκεια  
αισθητήρα



Εισαγωγή  
αισθητήρα  
χωρίς βελόνα

**MENARINI**  
diagnostics

Living your life.

**Januvia**  
(sitagliptin, MSD)

**Janumet**  
(sitagliptin/metformin, MSD)



### 1. SmPC JANUVIA, SmPC JANUMET

Για την πλήρη περιληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδα.  
Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**».

JANUMET (50+1000) ΛΤ: 30,63€, JANUMET (50+850) ΛΤ: 41,23€, JANUVIA (100) ΛΤ: 30,18€, JANUVIA (50) ΛΤ: 24,66€



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39,  
2031 BN Haarlem, Ολλανδία  
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: MSD Α.Φ.Ε.Ε.  
Αθήνα: Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος, 174 56, Αττική  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121088101000  
Τηλ.: 2109897300  
www.msd.gr  
E-MAIL: dpoc\_greece@merck.com



**BIANEX** Α.Ε.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

#### Συνπρώθηση και διανομή:

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία  
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@bianex.gr  
• WEBSITE: www.bianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμιου 113,  
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



Τίτλοι  
Ομιλητών - Προέδρων - Συντονιστών



## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

- ΜΑΝΤΖΟΡΟΣ C.** MD, DSc, PhD, Professor of Medicine, Harvard Medical School Professor in Environmental Health, Harvard School of Public Health
- ΑΓΓΕΛΙΔΗ Α.** MD, PhD, Ειδικός Παθολόγος, Postdoctoral Fellow, Division of Endocrinology BIDMC, BCH, Harvard Medical School Postdoctoral Scholar, Broad Institute of MIT and Harvard
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ.** Ειδική Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, Επιμελήτρια, Παθολογικό Τμήμα, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
- ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ.** MD, PhD, Clinical hypertension specialist EHS, Προϊστάμενος Διευθυντής Παθολογίας Α΄ Παθολογικού τμήματος και Διοικητικός Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου Τζανείου ΓΝ Πειραιά
- ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ.** MD, PhD, Παθολόγος, Διευθύντρια Διαβητολογικού Ιατρείου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
- ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Β.** Παθολόγος, MSc, Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο MEDITERRANEO
- ΒΡΑΝΟΥ Ο.** Παθολόγος με μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη
- ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.** Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επισ. Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.** Ειδικός Παθολόγος
- ΓΙΑΝΝΟΥ Ε.** Ποδολόγος, Επισ. Συνεργάτης Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΓΚΙΖΛΗΣ Β.** Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός, Μετεκπαιδευθείς στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Γραμματέας Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην ΠΦΥ, Μουζάκι
- ΔΗΜΟΥ Ε.** Γενική Ιατρός, Διευθύντρια-Υπεύθυνη για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του ΚΥ Καρλοβασίου, Σάμος
- ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΥ Σ.** Παθολόγος Διαβητολόγος
- ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Α.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, MD, PhD, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Συντονιστής Εκπαίδευσης Γενικών Ιατρών ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΥ Β.** Ειδική Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη
- ΚΑΤΣΟΥΡΗ Β.** Γενικός Ιατρός με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη
- ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Α.** MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελητής Α΄, Υπεύθυνος Ιατρείου Λιπιδίων, Υπεύθυνος Ιατρείου Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 & Διαβήτη κύησης, Γ΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

- ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ι.** MD, PhD, FNSCOPE, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής & Κλινικής Covid, Επιστημονικός Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου - Παχυσαρκίας, ΓΝ Αττικής ΚΑΤ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.** Ειδικός Παθολόγος με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη
- ΚΩΝΣΤΑΣ Χ.** Φυσιοθεραπευτής, Επιστ. Συνεργάτης Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Κ.** Ειδικός Παθολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου & Λιπιδαιμικού Ιατρείου, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΛΙΟΣΗ Β.** Παθολόγος, MSc, Αρχίατρο ΓΕΣ, Εξειδικευόμενη Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΛΙΟΥΡΗ Ε.** Ειδική Παθολόγος με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη
- ΜΑΥΡΟΣ Β.** Ειδικός Παθολόγος με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη
- ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ Μ.** Νοσηλεύτρια ΠΕ, Προϊσταμένη Καρδιολογικού Τμήματος - Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ Α.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Διαβητολογικό Καρδιομεταβολικό Κέντρο «METROPOLITAN HOSPITAL»
- ΜΕΛΛΟΣ Χ.** Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α΄ ΤΕΠ - ΓΝ Κορίνθου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας
- ΜΠΑΡΑ Α.** Γενικός Ιατρός, Επιμελήτρια ΕΣΥ, ΤΕΠ ΓΝ Κορίνθου
- ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.** Νεφρολόγος, Επιστημονική Διευθύντρια Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΙΩΝΙΟ», Πειραιά
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.** Γεν. Ιατρός με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιστ. Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΝΤΙΝΑΣ Α.** Ειδικός Γενικής Ιατρικής
- ΞΟΥΡΓΙΑ Ε.** MD, PhDc, Επιστ. Συνεργάτης Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.** Αρχίατρος, Ειδικός Παθολόγος με Μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελήτρια ΜΕΘ - Διαβητολογικό Ιατρείο 410 ΓΣΝΑ
- ΡΟΥΣΟΥ Κ.Β.** Γενικός Οικογενειακός Ιατρός
- ΣΕΡΕΤΗ Α.** Παθολόγος Διαβητολόγος, Συντονίστρια - Διευθύντρια, Γ΄ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΣΤΑΥΡΟΥ Ι.** Ειδικός Παθολόγος

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

- ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ Α.** Παθολόγος με μετεκπαίδευση στο ΣΔ, Επιμελήτρια, Διαβητολογικό Καρδιομεταβολικό Κέντρο «METROPOLITAN HOSPITAL»
- ΤΣΑΓΚΑΡΗ Α.** RD, PhD, Κλινική Διαιτολόγος, Τμήμα Διατροφής, ΓΝΑ ΚΑΤ
- ΤΣΑΝΤΑΝΗ Α.Μ.** Γενική Ιατρός
- ΤΣΟΥΡΟΥΣ Γ.** Ειδικός Παθολόγος με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
- ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ Κ.** Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΦΛΩΡΟΥ Σ.** Παθολόγος με μετεκπαίδευση στο ΣΔ
- ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ Ε.** M.D., Ph.D., Παθολόγος με εξειδίκευση στο ΣΔ, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ιατρικός Διευθυντής MEDOC: Mediterranean Diabetes and Obesity Clinics
- ΦΟΥΤΡΗΣ Α.** Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελητής Α, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- ΧΑΡΑΜΗΣ Α.** Παθολόγος
- ΧΑΡΠΙΔΗΣ Κ.** Παθολόγος, Εξειδικευμένος στο ΣΔ, Επιστ. Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΧΕΛΙΩΤΗ Ε.** MD, PhD, Διευθύντρια Νεφρολογίας, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ιατρείου Σπειραματονεφριτίδων, Νεφρολογικό Τμήμα-Μ.Τ.Ν., ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- ΧΟΥΡΔΑΚΗ Ε.** Ειδική Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Διαβητολογικού - Καρδιομεταβολικού Κέντρου, «METROPOLITAN HOSPITAL»

Βοηθήστε τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

# ΟΖΕΜΠΡΙC® - Ο ΝΕΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

στη διαχείριση των αρρυθμιστων ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

ΟζεμπρίC® - Εβδομαδιαία αγωνιστής υποδοχέα GLP-1 που συνδυάζει ανώτερη αποτελεσματικότητα\* στη μείωση της HbA1c και του σωματικού βάρους, 1<sup>5,7,8,9</sup>

**ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ<sup>1</sup>** \*5,7,8,9\*

**ΑΠΟΔΕΙΞΙΜΕΝΟ<sup>1</sup> ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ<sup>5†</sup>**

**ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ<sup>1</sup>** \*5,7,8,9\*

\*Τα αποτελέσματα αφορούν το ΟζεμπρίC® σε όλες τις συγκριτικές μελέτες SUSTAIN, οι οποίες περιλαμβάνουν ειδικό φάρμακο, τη σταλατιπίνη, τη ντουλαγλουτίδη, την εξενάτινη ER, την ινσουλίνη glargine U100, την καναλιφλοζίνη και τη λιραγλουτίδη.<sup>1,2,7,8</sup>



Για ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που υπερισχύει η αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος (ασθενείς με δείκτες υψηλού κινδύνου για ASCVD ή εγκατεστημένη ASCVD).<sup>†</sup>

**Το Consensus Report των ADA/EASD 2019 συνιστά τη θεραπεία με αγωνιστή του υποδοχέα του GLP-1 με αποδεδειγμένο<sup>6</sup> καρδιαγγειακό όφελος<sup>6</sup>**

Το ΟζεμπρίC® (σεμαγλουτίδη) έχει ένδειξη για τη θεραπεία ενήλικων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που δεν ελέγχεται επαρκώς σε συνδυασμό με διαίτα και άσκηση.



Το μοντέλο δεν είναι πραγματικός ασθενής.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επέμβει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενα ανεπιθύμητα ενέργειες. Ως παραφάρμακο «επιπλέοντες ενέργειες» για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ** ΟζεμπρίC 0,25 mg, ΟζεμπρίC 0,5 mg, ΟζεμπρίC 1 mg ελάχιστο διάστημα σε προηγούμενη ουσική τύπου πέναν 100 mg. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Ένα ml διαλύματος περιέχει 1,34 mg σεμαγλουτίνης\*, ΟζεμπρίC 0,25 mg. Μια προηγούμενη ουσική τύπου πέναν περιέχει 2 mg σεμαγλουτίνης\* σε 1,5 ml διαλύματος. Κάθε δόση περιέχει 0,25 mg σεμαγλουτίνης σε 0,19 ml διαλύματος. ΟζεμπρίC 0,5 mg. Μια προηγούμενη ουσική τύπου πέναν περιέχει 2 mg σεμαγλουτίνης\* σε 1,5 ml διαλύματος. Κάθε δόση περιέχει 0,5 mg σεμαγλουτίνης σε 0,37 ml διαλύματος. ΟζεμπρίC 1 mg. Μια προηγούμενη ουσική τύπου πέναν περιέχει 4 mg σεμαγλουτίνης\* σε 3,0 ml διαλύματος. Κάθε δόση περιέχει 1 mg σεμαγλουτίνης σε 0,74 ml διαλύματος. **Ανάλυση της αβηρμικής οργάνωσης φιλνοκυκλώφου πεπτιδίο-1 (GLP-1)** που παρασκευάζεται με χρήση της τεχνολογίας αναδιπλασιασμένου DNA σε κύτταρα *Saccharomyces cerevisiae*. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το ΟζεμπρίC ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που δεν ελέγχεται επαρκώς σε συνδυασμό με διαίτα και άσκηση, ή μονοθεραπεία όταν η μετροπινίδη απαιτείται ακατάλληλη εξέλιξη διαβητικής ή αντιδραστικής σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης** Δοσολογία Η αρχική δόση είναι 0,25 mg σεμαγλουτίνης μία φορά εβδομαδιαίως. Μετά από 4 εβδομάδες, η δόση πρέπει να αυξάνεται στο 0,5 mg μία φορά εβδομαδιαίως. Μετά από τουλάχιστον 4 εβδομάδες με δόση 0,5 mg μία φορά εβδομαδιαίως, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 1 mg μία φορά εβδομαδιαίως προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω ο γλυκαιμικός έλεγχος. Η σεμαγλουτίδη 0,25 mg δεν αποτελεί δόση συντήρησης. Εβδομαδιαίες δόσεις μεγαλύτερες του 1 mg δεν συνιστώνται. Όταν το ΟζεμπρίC προστίθεται σε υπάρχοντα αγωγή με μετροπινίδη ή και θεοαλδοστερόνη ή σε αναστάτες 2 αμφοτεροαμινογλυκοζίνης (SGLT2), η τρέχουσα δόση μετροπινίδη ή/και θεοαλδοστερόνης ή αναστάτες SGLT2 μπορεί να διατηρηθεί αμετάβλητη. Όταν το ΟζεμπρίC προστίθεται σε υπάρχοντα αγωγή με σεμαγλουτίνη ή ινσουλίνη, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης της σεμαγλουτίνης ή της ινσουλίνης για τη μείωση του κινδύνου υπογλυκαιμίας. Δεν είναι αναγκαία η αυτοπαρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα για τη ρύθμιση της δόσης του ΟζεμπρίC. Η αυτοπαρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση της δόσης της σεμαγλουτίνης και της ινσουλίνης. **Εάν είναι ένδειξη το ΟζεμπρίC και μείωση ή αύξηση.** Συνιστάται μια προέλεγχση σταδιακής μείωσης της ινσουλίνης. Παράλληλη δόση Εάν παραλειφθεί μία δόση, αυτή πρέπει να χορηγηθεί το συντομότερο δυνατό και εντός 5 ημερών από την παράλειψη της δόσης. Εάν έχουν παραλειφθεί περισσότερες από 5 ημέρες, η δόση πρέπει να παραλείπεται οριστικά και η επόμενη δόση να χορηγηθεί κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, οι ασθενείς μπορούν επίσης να ανανεώσουν το συνήθες πρόγραμμα χορήγησης της μίας φορές εβδομαδιαίως. **Ηλικιωμένοι** Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης βάσει της ηλικίας. **Η θεραπευτική εμπειρία σε ασθενείς ηλικίας 2,75 είναι ελάχιστη.** **Νευρική δυσλειτουργία** Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια, μέτρια ή σοβαρή νευρική δυσλειτουργία. Η εμπειρία με τη χρήση της σεμαγλουτίνης σε ασθενείς με σοβαρή νευρική δυσλειτουργία είναι περιορισμένη. Η σεμαγλουτίδη δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου. **Ηπατική δυσλειτουργία** Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Η εμπειρία με τη χρήση της σεμαγλουτίνης σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία είναι περιορισμένη. Πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή κατά τη χορήγησης σε ασθενείς που υποφέρουν από ασθένειες του ήπατος. **Παθολογία** Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της σεμαγλουτίνης σε παθολογία του ήπατος και νεφρούς ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. **Τράχηση** Η ΟζεμπρίC χορηγείται μία φορά εβδομαδιαίως οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με ή χωρίς γεύματα. Το ΟζεμπρίC χορηγείται υποδοχόμενα έναντι στην κοιλία, του μισού ή του άνω μισού του βραχίονα. Η θέση της ένεσης μπορεί να αλλάξει χωρίς προσαρμογή της δόσης. Το ΟζεμπρίC δεν πρέπει να χορηγηθεί ενδοφθάλμια ή ενδομυϊκή. Η μέγιστη εβδομαδιαία χορήγηση μπορεί να αλλάξει, εάν είναι απαραίτητο, εφόσον το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο δόσεων είναι τουλάχιστον 3 ημέρες (≥ 72 ώρες). Μετά την επίλυση νέων μισών χορήγησης, πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα χορήγησης της μίας φορές εβδομαδιαίως. **Αντενδείξεις** Υπερσυστασία ή/και δραστησιότητα ή σε κλίση από το έδαφος. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** Η σεμαγλουτίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θεραπεία.

ADA=Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία. EASD=Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Μελέτη του Διαβήτη. GLP-1=γλυκογονόλυφο πεπτιδίο-1. †Τμή μελέτη SUSTAIN 6, το ΟζεμπρίC® μείωσε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο (πέναν από καρδιαγγειακό αίμα, μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο), συγκριτικά με το ειδικό φάρμακο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 οι οποίοι διέτρεχαν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, επιπρόσθετος της πρότυπης φροντίδας. Το αποτέλεσμα λήξης της μελέτης καρδιαγγειακής έκβασης SUSTAIN 6 ή του ΟζεμπρίC® βρίσκονται στην παράγραφο 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Καρδιαγγειακή νόσος). ‡Σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. \*Αποδεδειγμένο καρδιαγγειακό όφελος σημαίνει ότι έχει επίσημη ένδειξη μείωσης καρδιαγγειακών επεισοδίων.

**Βιβλιογραφία:** 1. Ozebir, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. (03/2021). 2. Pratlley RE, Arora VR, Lingway L, et al; SUSTAIN 7 Investigators. Semaglutide versus dulaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 7): a randomised, open-label, phase 3b trial. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2018;6(4):275-286. 3. Ahmann et al. *Diabetes Care.* 2018;41(2):258-66. 4. Arora VR et al. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2017;5:555-66. 5. Marsó SP, Bain SC, Consoi A, et al; SUSTAIN-6 Investigators. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2016;375(19):1834-1844. 6. Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, et al. 2019 update to management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care.* 2020;43(2):487-493. 7. Lingway L, Catanga AM, Frías JP, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus daily canagliflozin as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 8): a double-blind, phase 3a, randomised controlled trial. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2019;7(10):834-844. 8. Capehorn MS, Catanga AM, Furlberg JK, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide 1.0 mg vs once-daily liraglutide 1.2 mg vs add-on to 1-3 oral antidiabetic drugs in subjects with type 2 diabetes (SUSTAIN 10). *Diabetes Metab.* 2020;46(2):100-109.



Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.  
Αλ. Παγανούλη 80 & Αγ. Τριάδας 65  
153 43 Αγία Παρασκευή  
Τηλ.: 210 60 71 600  
http://www.novonordisk.gr  
http://www.novonordisk.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανασφραγίστε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ONCE-WEEKLY  
**OZEMPIC®**  
semaglutide injection

GR12/02/000035



# ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

σε συνεργασία με το Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Υπεύθυνος: Δρ Α. Καμαράτος)

## ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ενημέρωση για το Σακχαρώδη Διαβήτη-Μεταβολικά Νοσήματα-Νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 2022» θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ» από 18 - 20 Φεβρουαρίου 2022.

## ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα:

Congress World Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

τηλ.: 210 72 10001, 210 72 22518, Fax: 210 72 10051

[www.congressworld.gr](http://www.congressworld.gr), email: [info@congressworld.gr](mailto:info@congressworld.gr)

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τεχνική γραμματεία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Θερμή παράκληση όλες οι παρουσιάσεις και ομιλίες να παραδίδονται στους υπεύθυνους τεχνικούς, τουλάχιστο μία ώρα πριν από την ώρα παρουσίασής τους σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα

## ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το συνέδριο αξιολογήθηκε με **16 Μόρια (Credits)** αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (EECCME-UEMS) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης (ΣΙΜΕ/CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πιστοποιητικό Συμμετοχής δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου. Για την παραλαβή του Μοριοδοτημένου Πιστοποιητικού Συμμετοχής, κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση του 60% του συνόλου των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο την online παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης και θα συνυπολογιστούν για την παραλαβή του Μοριοδοτημένου Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (E-certificate).

Η έκδοση του E-certificate θα μπορεί να γίνει 3 μέρες μετά από τη λήξη του Συνεδρίου, ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες που θα παραλάβουν στο email της εγγραφής τους οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι.

## ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Σύμφωνα με το ισχύον Υγειονομικό Πρωτόκολλο πέραν της θερμομέτρησης, η είσοδος με φυσική παρουσία στο συνεδριακό χώρο θα επιτρέπεται στους συμμετέχοντες:

- με την επίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού τους,
- με την επίδειξη Βεβαίωσης πρόσφατης νόσησης (του τελευταίου τριμήνου)



# forxiga®

(dapagliflozin) 10mg



## Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρορική δαπαγλιφλοζίνη με προπυνοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης.

Έκδοχο με γνωστές δράσεις:

Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg άνυδρης λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατήστε **εδώ**.

AstraZeneca 

AstraZeneca A.E.,  
Αγισιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195  
[www.astrazeneca.gr](http://www.astrazeneca.gr)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28  
N.T. 28,75€ / Λ.Τ. 45,53€

# ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

